



Садовые центры и питомник растений «АРТ-ЛАНДШАФТ»

Офис: г. Екатеринбург, Московский тракт 9 км дом 14

E-mail: kalina1@list.ru, www.art-landshaft.ru

Тел. 8(343)213-13-85

Ранневесенняя обработка сада — это самый важный этап в борьбе за будущий урожай. Ваша главная цель сейчас — успеть провести обработки до того, как проснутся вредители и начнут разлетаться споры грибов. Ориентир — температура воздуха выше +4...+5°C в сочетании со спящими почками (дерево или куст еще голые).

Основные обработки и средства для обработки по целям применений.

1. Искореняющая обработка (по спящим почкам)

Направлена на уничтожение зимующего запаса инфекции и яиц вредителей.

Препарат 30 (или "Профилактин"). Это особое средство, которое работает не как яд, а как удушье. Маслянистая пленка перекрывает воздух яйцам тли, щитовки и клещам. Применяется строго до набухания почек.

Абига-Пик или медный купорос (бордоская жидкость). Классическая защита от грибковых болезней (парша, монилиоз, коккомикоз). Абига-Пик норма применения 50 г/10 л воды. Медный купорос 100 г + 100 г извести на 10 л воды (если используете готовую бордоскую смесь — разводите по инструкции).

Мочевина (Карбамид) с медным купоросом (500-700 г мочевины и 50 г медного купороса на 10 литров воды). Мочевина в высокой концентрации работает как "химический ожог" для грибов и тли, а медь усиливает защиту. Важно: это делается строго до распускания почек!

Железный купорос. Ваш выбор, если на коре деревьев есть мох или лишайник. Он их буквально выжигает. Концентрация: 300 г/10 л воды (для голых веток). Также хорошая профилактика грибковых болезней.

2. Обработка по "Зеленому конусу"

Когда почки лопнули и показался зеленый кончик листа, обработки проводят аккуратно, чтобы не сжечь молодую листву. Но обрабатывать все еще нужно.

Абига -Пик 50г/10 л воды (бордоская смесь 1% раствор) повторная обработка по распускающимся почкам

Можно начинать применять системные фунгициды (Хорус, Скор), которые не смываются дождем и работают при невысоких температурах.

Актара 4 г/ 10 л воды против просыпающихся насекомых вредителей (короеды, тли, белокрылка, трипсы). Актару 1,4 г/10 л воды можно пролить также в прикорневую зону против зимующих насекомых.

3. Обработка инсектицидами и биопрепаратами, внекорневая подкормка микроэлементами по распустившейся молодой листве. Подкормка в корень раствором сульфата магния.

Когда на улице установилась теплая погода (выше +15°C), важно провести обработку против вредителей и внекорневую подкормку по хвое хвойных и распускающимся листьям лиственных деревьев и кустарников используя биопрепараты.

Актара 4г/10 л воды повторная обработка.

Клиппер 0,03-0,06% раствор (Фитоверм, Битоксибациллин) — против насекомых вредителей.

Фитоспорин — против грибков.

Гумат (ГумиТорф) совместно с хелатом железа 3% и хелатом меди 3-5 % применяют для пополнения в тканях молодых листьев и побегов железа и меди, жизненно необходимых при росте молодых тканей растения. Гуматы кроме органических веществ, содержат также азот, фосфор, калий и натрий, необходимые для питания растений, улучшают иммунитет растения, улучшают цвет листьев, оказывают антистрессовый эффект при резких перепадах погодных условий.

Главный совет по очередности обработок.

Просто запомните последовательность:

1. Конец марта, начало апреля: Препарат 30-В (или "Профилактин") от насекомых и болезней, Абига-Пик или медный купорос (бордоская жидкость) от грибковых болезней, Железный купорос (от лишайников) или Мочевина + медь (от всего).
2. Вторая половина апреля (зеленый конус): Абига -Пик (бордоская смесь 1% раствор), Актара
3. Май (тепло): Актара, Клиппер, биологические препараты Фитоверм, Битоксибациллин от насекомых, Фитоспорин — против грибков если есть необходимость.
4. Внекорневая подкормка-Гумат (ГумиТорф), хелат железа 3% и хелат меди 3- 5 %. Сульфат магния в корень.

Благодарим Вас за покупку!

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам в уходе за растением.

Желаем Вам цветущего сада!

С любовью Арт-Ландшафт.

Петрова И.В. главный агроном